

斐林试剂(中学实验试剂)

产品简介:

生物组织中普遍存在的可溶性糖种类较多,有葡萄糖、果糖、麦芽糖、半乳糖、乳糖、蔗糖等。前五种糖的分子内含有自由的或潜在的醛基或酮基,为还原糖;蔗糖分子内没有,为非还原糖,不具有还原性。

斐林试剂(Fehling's Solution)又称菲林试剂或斐林试剂,是德国化学家 Hermann von Fehling 1849 年所发明。斐林试剂与 Benedict's Reagent 相似,均是用来检测还原糖的存在,其检测原理是在碱性加热条件下,可溶性的还原性糖(葡萄糖、果糖和麦芽糖)将铜元素微粒还原(碱性新制氢氧化铜悬浊液中与还原糖发生氧化还原反应的铜元素微粒是 $[\text{Cu}(\text{OH})_4]^{2-}$,即四羟基合铜酸根离子),同时生成糖酸、 Cu_2O 等产物。糖的还原作用生成 Cu_2O 沉淀的颜色决定于颗粒的大小,而 Cu_2O 颗粒的大小又决定于反应速度。反应速度快时,生成的 Cu_2O 颗粒较小,呈黄绿色;反应速度慢时,生成的 Cu_2O 颗粒较大,呈红色。所以,溶液中还原糖的浓度应该从生成沉淀物的质量来评估,而不能依据沉淀的颜色来判断。

Leagene 斐林试剂(中学实验试剂)主要由钠、硫酸铜等组成,常用于可溶性还原糖的鉴定,亦可用于尿糖的定性鉴定,不宜用于定量检测。该试剂仅适用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	TC0070	TC0070	Storage
		2×100ml	2×500ml	
试剂(A): 斐林试剂 A		100ml	500ml	RT
试剂(B): 斐林试剂 B		100ml	500ml	RT
使用说明书		1 份		

自备材料:

- 待测样品(苹果或梨的匀浆)、试管、恒温水浴锅

操作步骤(仅供参考):

- 操作步骤略,如需完整版请咨询客服。

注意事项:

- 试剂(A)为无色透明溶液,有一定腐蚀性,应小心操作。
- 该试剂仅用于科研用途,不宜用于临床检测。

- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12个月有效。

相关产品：

产品编号	产品名称
CC0128	胰蛋白酶-EDTA 溶液(0.25%:0.02%,含酚红)
DP0013	GUS 染色液(即用型)
DZ2011	环保浸蜡脱蜡透明液
PT0001	BCA 蛋白定量试剂盒
TC0699	植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)